

ОДОБРЕНО

Совет по ветеринарным препаратам
протокол от «24» февраля 2021 г № 113

Инструкция по применению препарата ветеринарного «Гермивет»

1 Общие сведения

1.1 Гермивет – (Germivetum).

1.2 Международное наименование: пиперазина адипинат.

1.3 Лекарственная форма: порошок.

1.4 В 1,0 г препарата содержится 0,5 г пиперазина адипината и наполнитель (глюкоза).

Препарат представляет собой порошок белого цвета.

1.5 Препарат выпускают в полимерной таре или в двойных пакетах из полиэтилена по 0,05 кг; 0,1 кг; 0,2 кг; 0,5 кг и 1,0 кг.

1.6 Препарат хранят в сухом, защищенном от света месте, при температуре от плюс 2 °С до плюс 30 °С.

1.7 Срок годности 4 года от даты изготовления, при условии соблюдения правил хранения.

2 Фармакологические свойства

2.1 Препарат относится к антигельминтным средствам.

2.2 Пиперазина адипинат, входящий в состав препарата, обладает активным действием против возбудителей семейства Trichonematidae, Parascaris equorum, Ascaris suum, Toxocara canis, Toxascaris leonine, Uncinaria stenocephale, Ancylostoma duodenale, Ascaridia galli, Heterakis gallinarum, Passalurus ambiguus.

2.3 Механизм действия препарата основан на нарушении проведения нервных импульсов в ганглиозных клетках гельминта, что усиливает двигательную активность паразитов, а затем вызывает их паралич. Угнетает яйцеобразование аскарид. Препарат малотоксичен.

3 Порядок применения

3.1 Препарат применяют с лечебной целью при параскариозе (параскаридозе) и трихонематидозах лошадей, аскариозе (аскаридозе) свиней, токсокарозе, токсаскариозе (токсаскаридозе), унцинариозе и анкилостомозе собак и пушных зверей, аскариозе (аскаридиозе) и гетеракидозе кур, пассалурозе кроликов.

3.2 Лошадям препарат применяют внутрь из расчета 0,2 г/кг массы тела животного однократно. Свиньям при аскариозе назначают два раза в день, утром и вечером, без предварительного голодного режима групповым способом или индивидуально в разовых дозах: молодняку весом до 50 кг - 0,6 г/кг массы тела животного, свиньям весом свыше 50 кг - 30,0 г на животное.

3.3 Собакам и пушным зверям при токсокарозе, токсаскариозе, унцинариозе и анкилостомозе применяют без предварительного голодного режима и без последующего введения слабительного в разовой дозе 0,4 г/кг массы тела животного индивидуально трехкратно 3 дня подряд.

3.4 Курам препарат применяют в разовой дозе: цыплятам в возрасте от двух до трех месяцев 0,2 г, молодняку и взрослым курам 0,25 г на птицу в день два дня подряд. Дают с кормом групповым способом утром.

3.5 Кроликам применяют после 18-24 часового голодного режима индивидуально или групповым способом с кормом. С лечебной целью: в дозе 2,0 г/кг массы тела животного однократно или 2 дня подряд в разовой дозе 1,0 г/кг массы тела взрослым кроликам, а молодняку после отъема 2 дня подряд в разовой дозе 1,5 г/кг массы тела животного. С профилактической целью применяют молодняку после отъема с кормом в дневной дозе 0,2-0,3 г/кг массы тела животного.

3.6 Препарат противопоказан кошкам.

3.7 При применении препарата может наблюдаться рвота, усиление перистальтики, понос, кратковременное нарушение координации движений.

3.8 При появлении побочных действий препарат отменяют и назначают атропина сульфат в терапевтических дозах.

3.9 Убой животных на мясо для использования в пищу людям и использование яиц от кур, обработанных препаратом, разрешено через 4 суток после последнего применения препарата.

4 Меры профилактики

4.1 При работе с препаратом необходимо соблюдать правила личной гигиены и техники безопасности.

5 Порядок предъявления рекламаций


5.1 В случае возникновения осложнений после применения препарата, его использование прекращают и потребитель обращается в Государственное ветеринарное учреждение, на территории которого он находится.

5.2 Ветеринарными специалистами этого учреждения производится изучение соблюдения всех правил по применению препарата в соответствии с инструкцией. При подтверждении выявления отрицательного воздействия препарата на организм животного, ветеринарными специалистами отбираются пробы в необходимом количестве для проведения лабораторных испытаний, пишется акт отбора проб и направляются в Государственное учреждение Белорусский государственный ветеринарный центр (220005, г. Минск, ул. Красная, 19А) для подтверждения на соответствие нормативным документам.

6 Полное наименование изготовителя

6.1 Производственное унитарное предприятие «Витебский завод ветеринарных препаратов», 210001, г. Витебск, ул.11-я Свердлова, 15В.

Инструкция по применению разработана сотрудниками УО «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия ветеринарной медицины» (Толкачем Н. Г., Петровым В. В.)

Департамент ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь	
Совет по ветеринарным препаратам	
ОДОБРЕНО	
Председатель	
Секретарь	
Эксперт	
24.02.2021	протокол № 113